3e Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario – Formulaire de données de l'Inventaire des Chouettes rayées et des Petites Nyctales en Ontario

Assurez-vous de saisir les données en ligne à l'adresse NatureCounts - Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario (birdscanada.org)

ID de la parcelle :	Votre nom :	Nom de l'adjoint.e :
Année : ____ Mois : ___ Jour : ___	Commentaires :	

Essai de diffusion : Encerclez la distance la plus grande à laquelle vous avez entendu l'appel diffusé par le lecteur MP3.
Voix de la Nyctale de Tengmalm : 100m 250m 500m **Voix de la Chouette rayée** : 100m 250m 500m

Codes d'espèces :

BDOW – Chouette rayée	BOOW – Nyct. de Tengmalm	EASO – Petit-duc maculé	GGOW – Chouette lapone	GHOW – Grand-duc d'Amérique	LEOW – Hibou moyen-duc
NSWO – Petite Nyctale	SEOW – Hibou des marais	NHOW – Chouette épervière	AMWO – Bécasse d'Amérique	WISN – Bécassine de Wilson	RUGR – Gélinotte huppée

Niveaux de bruit. Indiquez l'effet du bruit ambient, naturel (p. ex. grenouilles) ou artificiel (trafic, pylônes), sur votre capacité de diffuser ou d'entendre.

1: Aucun bruit ou bruit léger, relativement tranquille, peu d'interférence.
2: Bruit modéré perturbant quelque peu la diffusion de l'enregistrement et/ou l'audition de l'oiseau.
3: Bruit élevé perturbant grandement la diffusion de l'enregistrement et/ou l'audition de l'oiseau.
4: Bruit extrême perturbant de manière excessive la diffusion de l'enregistrement et/ou l'audition de l'oiseau.

Codes d'indices de nidification (du plus faible au plus probant)

H Espèce observée pendant sa période de reproduction dans un habitat de nidification propice.
S Mâle chanteur présent, ou sons associés à la reproduction (p. ex., cris ou tambourinage) entendus pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice.
M Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons associés à la reproduction (p. ex., cris, tambourinage) entendus au cours d'une même visite.
P Couple observé pendant la période de reproduction de l'espèce dans un habitat de nidification propice.

			Enregistrement des observations (X = entendu / S = vu / XS = entendu et vu)								Direction et distance (m) de chaque individu entendu ou vu la première fois					Conditions et remarques	
Stn nº (nº point d'écoute)	Heure (24 h)	Espèce	1re min.	2e min.	Après BOOW	Après 1er BDOW	Après 2e BDOW	Après 3e BDOW	Après 4e BDOW	Code d'indice de nidification	Direction	<200	200-500	500-1000	1000+	Trafic (nbre de véhicules)	Niveau de bruit (1-4)
	Exemple																
1	22:12	BDOW	X			X	X	XS	S	S	NE	X				2	1
		NSWO			X	X					O		X			Duo de BDOW (S), GHOW éloigné	
		BDOW					X	X	X		SO			X			
		GHOW						X	X		E				X		

3e Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario – Formulaire de données de l'Inventaire des Chouettes rayées et des Petites Nyctales en Ontario

			Enregistrement des observations (X = entendu / S = vu / XS = entendu et vu)								Direction et distance (m) de chaque individu entendu ou vu la première fois					Conditions et remarques	
Stn nº (nº point d'écoute)	Heure (24 h)	Espèce	1re min.	2e min.	Après BOOW	Après 1er BDOW	Après 2e BDOW	Après 3e BDOW	Après 4e BDOW	Code d'indice de nidification	Direction	<200	200-500	500-1000	1000+	Trafic (nbre de véhicules)	Niveau de bruit (1-4)